

อัตราการใช้

ใช้ในระยะที่ต้องการให้พืชออกดอก • ลำไย มะม่วง ใช้อัตรา 150 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงต้องการดอก • ทุเรียน ใช้อัตรา 150-200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ 7-10 วัน • ลองกอง ใช้อัตรา 200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นในช่วงที่ดอกงอกกระทบแสงมาเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อเพิ่มปริมาณดอก เร่งให้ดก • มังคุด ใช้อัตรา 200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นทุก 5-7 วัน • มะนาว ส้ม ชมพู ส้มโอ ใช้อัตรา 150 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน • เงาะ ใช้อัตรา 150 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้นทุก 7-10 วัน • มะขาม ขนุน ใช้อัตรา 200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ควรใช้ตามคำแนะนำตามฉลาก



ปริมาณสุทธิ 500 ซีซี

ผลิตโดยและจำหน่ายโดย : บริษัท ชิดได้ (ประเทศไทย) จำกัด
72/79 หมู่ 1 ซ.พระมหากรุณา ถ.สีวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-961-5021-3 , 02-589-0588 แฟกซ์. 02-961-4759

วันที่ผลิต :

G-SPRINK

จี-สปริงค์

อาหารเสริมพืชเปิดดอก



ตราม้า



เพื่อกระตุ้นการออกดอก

คุณสมบัติ เป็นสารอินทรีย์สกัดจากสาหร่าย *Ascophyllum nodosum* และ *Sargassum wightii* ร่วมกับสารสังเคราะห์ทางเคมีที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พืชสามารถซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งทางราก ทางใบ และลำต้น ทำให้พืชเจริญเติบโตรวดเร็ว สมบูรณ์ แข็งแรง เร่งการออกดอกติดผล ทำให้ชิวเหนียว ไม่ร่วงง่าย ผลโต และรสชาติดี ช่วยแก้ปัญหาคาบชาตาอาหารเสริมธาตุปฏิกิริยาต่างๆ ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วขึ้น ภายหลังได้รับสารที่เป็นพิษหรือการทำลายของศัตรูพืชช่วยกระตุ้นให้พืชแตกตาใบ หรือตาออกได้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้นน้ำย่อย และควบคุมการทำงานของภายในพืชให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสังเคราะห์อาหาร การสังเคราะห์แสง การทำงานของระบบรากให้ดูดกินปุ๋ยได้ดีขึ้น ทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรค

จี-สปริงค์ ช่วยให้พืชออกดอก ออกทรง เพิ่มปริมาณดอกของพืช เร่งให้ดก พืชออกดอกได้ก่อนกำหนดปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม **จี-สปริงค์** เป็นสารธรรมชาติ และสารสังเคราะห์ที่ครบวงจรที่สุด และไม่ทำอันตรายต่อพืชเมื่อใช้ต่อเนื่อง

คำแนะนำการใช้ ฉีดพ่นที่ใบ กิ่งก้านสาขา ให้พืชมีความพร้อมต่อการออกดอกติดผล เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พืช ฉีดทุก 10-15 วัน/ครั้ง ใช้เปิดตาออกในระยะต้องการ ให้พืชออกดอก เร่งให้พืชออกดอก ได้ก่อนกำหนด ควรฉีดพ่นในระยะที่พืชกระทบแสง หรือฝนทิ้งช่วง โดยเน้นที่ท้องกิ่งของพืช ที่ออกดอกบริเวณท้องกิ่ง โดยสามารถผสมกับยาปราบศัตรูพืชได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นยาฉีดที่เป็นด่างจัด